

Enumération des variétés de ce Rosier.

ROSA SPINULIFOLIA.

R. germinibus ovatis (globosive) pedunculisque spinosis; calycibus pinnatis, pinnis linearibus; pedunculis (petiolis) villosis aculeatis; foliis supra glabris, infra spinosulis. DEM. l. c.

* Tubes ovoïdes, aiguillons droits.

α. R. spinulifolia DEMATRATIANA. THY. l. c.

R. germinibus ovatis pedunculisque glanduloso-hispidis; foliis orbiculato-ovalibus, supra glabris, subius undique spinosulis; serraturis glanduloso-serratis; caule aculeis rectis, subgeminatis.

HABITUS.

FRUTEX 3—4, pedalis, ramosus. RAMI stricti, fuscii, aculeis rectis, solitariis vel geminatis, etiam ternatis armati. FOLIOLA quina rarius septenna, orbiculato ovalia, supra glabra, subtus, ad nervos et venas, spinulis glandulisque obsita, profunde serrata, serraturis subiterum serratis, villosis-glandulosis. PETIOLI tomentosi, aculeolati. STIPULÆ acuminatæ, supra glabræ, subtus villosæ, margine glandulosæ. PEDUNCULI terminales, solitarii, glanduloso-hirsuti. TUBUS CALYCIS oviformis, glanduloso-setosus, setis subreflexis. LACINIE CALYCINE glandulis sessilibus præditæ, intus margineque albo-tomentosæ, appendiculatæ, appendicibus linearibus. PETALA quinque, obcordata, pallide rubra. FRUCTUS oviformis, hispidus, pheniceo-purpureus: maturus nigrescit. (N.)

Découvert près Châtel-sur-Montsalvens, dans le canton de Fribourg, en Suisse, par M. le doyen DEMATRA, curé de Corbières.

** Tubes globuleux, aiguillons presque droits.

β. R. spinulifolia FOXIANA. THY. l. c. p. 116, fig. 2.

R. germinibus globosis; foliis oblongo-ovalibus, subtus dense spinosulis glandulosisque; caule aculeis subrectis.

HABITUS.

FRUTEX 4 pedalis et altior, erectus, ramosus. RAMI aculeis subrectis, geminatis armati. FOLIOLA oblongo-ovalia, subtus, dense, spinulis glandulisque obsita. TUBUS CALYCIS globosus. LACINIE CALYCINE lanceolata, apice dilatata, appendiculata. FRUCTUS globosus hirsutus. Cætera uti in variatione α. (N.)

Nous avons dédié cette variété à la mémoire du célèbre Fox (Ch.-J.), l'un des plus grands orateurs dont s'honore l'Angleterre: on sait que parmi ses délassements favoris, la Botanique était au premier rang, et qu'à sa campagne, *Saint-Anne's-hill*, il cultivait particulièrement les Rosiers, même qu'il en possédait une riche collection, classée par espèces, et dans un ordre admirable.

Ce Rosier croît spontanément sur la bordure des bois, aux environs de Verviers (Pays-Bas), d'où il nous a été rapporté vivant, avec plusieurs autres, par M. LEMANCEAU, dans l'été de 1819. Les pétales sont plus grands et d'un rouge un peu plus vif que dans la var. α. Il nous a semblé ne différer en rien du R. *Pseudo-rubiginosa* de LEBEUE, Fl. de Spa 1, p. 229, autant qu'il nous a été possible d'en juger d'après un exemplaire desséché de ce dernier Rosier qui nous a été envoyé par mademoiselle LIBERT de Malmédy.